

1. *R. Canina rubra*. DESV. l. c. p. 114. 5. — *R. Damula*. BUCHEN.
 2. *R. Canina umbellata*, petalis glanduloso-hispida; floribus pallide rubris
 subumbellatis; pedunculis glabris. (N.) Ressemble, par le port, au *Collina* *fraxinea*.
 3. *R. Canina scabra*, petalis subglabris aculeatis; floribus 3-5, subsessilibus, corymbo-
 sis albo rubris. (N.)
 4. *R. Canina subumbellifolia*, foliis elliptico-ovatis; pedunculis hispida, non glo-
 bulis. (N.)
 5. *R. Canina occidentalis* (pedunculis hispida). DESV. l. c. var. 6.
 6. *R. Canina glandulosa*. RAV. l. c. p. 75, var. 7. — *R. Sepularis* MÉRAT 192. — *R. Ca-*
nina sepularis NOU. DUCH. — *R. Sepium* *sepularis*. DESV. l. c. var. 8.
 7. *R. Canina lanceolata*. DESV. l. c. p. 114, var. 9.

§. R.

Tubes des calices ligulés, ainsi que les péduncules.

* Tubes globuleux.

R. VERTICILLACANTHA. MÉRAT.

- III. Voir MÉRAT, Fl. de Paris, p. 190. — *R. Canina globulosa*. DESV. l. c. var. 9; au
R. Sepium 2, du même auteur?

** Tubes ovales.

R. ANDEGAVENSIS. BAST.

- IV. Voyez tome 1 de cet ouvrage, p. et fig. 9. — *R. Sempervirens*. RAV. l. c. p. 120.
 (C'est par erreur que nous avons rapporté le Rosier de M. RAV. au *R. Sempervirens*, non à celui-ci ouvrage, p. 16.)

5. *R. Andegavensis glaucescens*, foliis integerrimis. (N.) — *R. Canina intermedia*.
 DESV. observ. p. 157, n° 6. Au *Sepium intermedia*, du même auteur tout, Bot. l. c. 7.
 6. *R. Andegavensis hispida*, foliis subovato-lanceolatis glaberrimis. (N.) — *R. Ande-*
gavensis J. D. C. Fl. franc. supplément à la troisième éd. — *R. Sempervirens*. BAST.
 Fl. M. et L. p. 138. — *R. Canina hispida*. DESV. obs. 157, p. 5.

Nous terminerons ici cette nomenclature à laquelle il nous eût été possible d'ajouter
 encore; mais nous nous sommes contentés d'y comprendre les seules variétés que nous
 avons observées dans leur état sauvage. Nous peignons, d'ailleurs, que les caractères
 d'après lesquels nous avons cru pouvoir réunir toutes ces espèces en un seul groupe sont
 suffisants, malgré leur peu d'importance, pour les séparer d'autres individus avec lesquels
 on les confond souvent. Au reste nous désirons que la sincérité et la bonne foi que nous
 avons mises dans nos recherches, puissent nous protéger contre le reproche de quelques
 innovations que nous nous sommes permises, parce que nous les avons crues indispensables.

Les fruits de tous ces Rosiers, que le peuple nomme des *gratte-culs*, sont employés à
 divers usages dans l'économie domestique. Les Allemands en font une sauce acidulée et
 très-agréable au goût (*hagebutten-sauce*); elle est d'une couleur semblable à celle qu'on
 nomme *rouge-tomate*. Les anciens croyaient que leurs racines guérissent la rage.

C'est principalement sur les individus de ce groupe qu'on trouve le *Bakgaur*, ou cette
 espèce de guile chevelue produite par le Diptère du Rosier. On le rencontre aussi, mais
 plus rarement, sur les autres espèces sauvages.

Enfin nous dirons, pour ceux qui l'ignorent, que c'est à l'occasion des formes que
 présentent les cinq divisions du calice des Rosiers *Canina*, ou de *chien*, qu'on a composé
 ces vers énigmatiques :

Quique nomen frater, non habetur et alter,
 Interdum duo, non unidarius ego.